

Hypersurfaces compactes d'un fibré vectoriel Riemannien à courbure moyenne prescrite

Pascal CHERRIER¹

et

Abdellah HANANI²

Abstract. Let M be a compact Riemannian manifold without boundary and let E be a Riemannian vector bundle over M . If Σ denotes the sphere subbundle of E , we look for embeddings of Σ into E admitting a prescribed mean curvature.

Mots clés : Connexions, relèvement, courbure moyenne, estimées a priori, les méthodes.

Classification matières 2010 : 35J60, 53C55, 58G30.

1 Introduction

Dans cette étude, on désigne par (M, g) une variété Riemannienne compacte sans bord, de dimension $n \geq 1$ et $(E, \tilde{g})$ un fibré vectoriel Riemannien sur M de rang $m \geq 2$. On note Σ le fibré unitaire correspondant et E_* le fibré E privé de la section nulle. On s'intéresse à la mise en évidence d'une hypersurface de E_* admettant une courbure moyenne égale à K , une fonction $\mathcal{C}^\infty$ strictement positive donnée sur E_* , et définie comme la trace de la seconde forme fondamentale relativement à la métrique. C'est un problème global où il s'agit de déterminer un plongement $\mathcal{Y}$ de Σ dans E_* ayant une courbure moyenne prescrite.

Dans le cadre euclidien, c'est-à-dire quand M est réduite à un point, un théorème de Bakelman et Kantor [2] assure, en dimension 3, l'existence d'une telle hypersurface sous la condition que la fonction K décroît plus vite que la courbure moyenne de sphères concentriques, i.e. il existe deux réels r_1 et r_2 tels que $0 < r_1 \leq 1 \leq r_2$ et

$$(1.1) \quad K(\xi) > \frac{m-1}{\|\xi\|} \text{ si } \|\xi\| < r_1, \quad K(\xi) < \frac{m-1}{\|\xi\|} \text{ si } \|\xi\| > r_2$$

jointe à l'hypothèse de monotonie

$$(1.2) \quad \frac{\partial [rK(r\xi)]}{\partial r} \leq 0, \text{ pour tout } \xi \in \Sigma.$$

1. Current address : Université de Paris VI, UFR 920 de Mathématiques, B.C. 172, 4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05, France

E-mail address : cherrier@ccr.jussieu.fr

2. Current address : Université de Lille 1, UFR de Mathématiques, Bât. M2, 59655, Villeneuve d'Ascq Cedex, France

E-mail address : abdellah.hanani@math.univ-lille1.fr

Une autre preuve, valable en toute dimension, est donnée par Treibergs et Wei [8] sous les conditions précédentes. L'hypothèse (1.2) leur a permis d'appliquer la méthode de continuité et leur donne l'unicité à homothétie près.

Dans le cadre des fibrés envisagés ici, des méthodes différentes de celles des auteurs précités s'imposent. En effet, on ramène le problème à la résolution d'une équation elliptique sur Σ dans laquelle, et contrairement aux cas ci-dessus cités, les dérivées de la fonction inconnue u sont pondérées par des puissances de e^u dont le degré varie de 0 à 4. Ceci complique substantiellement l'obtention de l'estimée $\mathcal{C}^1$ et met en péril l'unicité à homothétie près même sous une hypothèse du type (1.2).

Quand la fonction prescrite ne dépend que du rayon, on obtient la caractérisation suivante.

Théorème 1. *Soit K une fonction continue sur E_* , partout strictement positive, et telle que $K(\xi) = K(\|\xi\|)$ pour tout $\xi \in E_*$. Alors, il existe un graphe radial $\mathcal{Y}$ sur Σ , de classe $\mathcal{C}^\infty$, à courbure moyenne égale à K si et seulement s'il existe un réel $r > 0$ tel qu'on ait :*

$$K(r\xi) = (m-1)r^{-1} \text{ quel que soit } \xi \in \Sigma.$$

La suffisance dans ce résultat est une conséquence de l'expression de l'opérateur de Weingarten de l'hypersurface Σ_r , le fibré en sphère de rayon $r > 0$. Quant à la nécessité, elle ne requiert que la continuité de K . On généralise ce résultat comme suit.

Théorème 2. *Soit $K \in \mathcal{C}^\infty(E_*)$ une fonction partout strictement positive. On fait l'hypothèse qu'il existe deux réels r_1 et r_2 , $0 < r_1 \leq 1 \leq r_2$, tels que les inégalités (1.1) soient satisfaites. Notons $\Sigma_{r_1, r_2} = \{\xi \in E; r_1 \leq \|\xi\| \leq r_2\}$ et supposons que K vérifie (1.2) en tout point de Σ_{r_1, r_2} et que la composante horizontale de son gradient y est partout nulle. Il existe alors un graphe radial $\mathcal{Y}$ sur Σ dont la courbure moyenne est donnée par K . Celui-ci étant de la forme $\xi \in \Sigma \mapsto e^{u(\xi)}\xi$, où $u \in \mathcal{C}^\infty(\Sigma)$ est une fonction à gradient horizontal identiquement nul.*

Dans le but d'établir ce théorème, on construit le graphe $\mathcal{Y}$, qui peut être vu comme une fibration dont la fibre $\mathcal{Y}_x$ au dessus du point $x \in M$ est une hypersurface de E_x obtenue par projection radiale de la fibre Σ_x de Σ , en résolvant une équation aux dérivées partielles elliptique sur Σ . Pour résoudre cette dernière, on utilise l'invariance du degré de Leray-Schauder d'une homotopie compacte relativement à un domaine borné du sous-ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^{1,\alpha}(\Sigma)$ dont la composante horizontale du gradient est identiquement nulle. L'application de celle-ci repose en partie sur l'obtention d'une estimée a priori dans $\mathcal{C}^{1,\alpha}(\Sigma)$. Remarquons que, dans ce résultat, l'hypothèse (1.2) est faite pour assurer la nullité du gradient horizontal de la solution. Celle-ci peut être omise. A cet égard, on démontre le théorème suivant.

Théorème 3. *Soit $K \in \mathcal{C}^\infty(E_*)$ une fonction partout strictement positive. On suppose qu'il existe deux réels r_1 et r_2 , $0 < r_1 \leq 1 \leq r_2$, tels que les inégalités (1.1) soient satisfaites. Il existe alors un graphe radial $\mathcal{Y}$ sur Σ , de classe $\mathcal{C}^\infty$, dont la courbure moyenne est donnée par K , et tel que $r_1 \leq \|\xi\| \leq r_2$ pour tout $\xi \in \mathcal{Y}$.*

Pour prouver l'existence d'une solution sous ces conditions, on se place dans le cadre fonctionnel $\mathcal{C}^\infty$ et on applique alors le théorème de point fixe de Nagumo [7]. Ceci est due au fait qu'en vue d'établir l'estimée $\mathcal{C}^1$ nécessaire pour résoudre, il faut disposer auparavant d'un contrôle sur le laplacien horizontal de toute solution éventuelle. Dans ce but, on étend l'équation à résoudre au voisinage de Σ , les valeurs à prescrire au bord étant du type Neumann. L'équation à considérer au voisinage de Σ est de sorte qu'une dérivation radiale et restriction à Σ de celle-ci donne le contrôle souhaité.

Nous présentons cet article en quatre parties. A la dernière, on donne la preuve des théorèmes et une remarque montrant que l'hypothèse de croissance des théorèmes 2 et 3 est dans un certain sens la meilleure possible. L'estimée a priori de la norme $\mathcal{C}^1$ nécessaire pour résoudre est présentée à la troisième partie. Une mise en équation est donnée à la seconde partie et, pour plus de clarté, on consacre la première partie de cet article à des notations et rappels préliminaires.

2 Notations et préliminaires

1- Soit (M, g) une variété Riemannienne compacte sans bord de dimension $n \geq 1$. Soient $(E, \tilde{g})$ un fibré vectoriel Riemannien sur M de rang $m \geq 2$, π la projection naturelle de E sur M et E_* le fibré E privé de la section nulle. On note ∇ la connexion de Levi-Civita de la variété (M, g) et $\tilde{\nabla}$ une connexion métrique sur le fibré $(E, \tilde{g})$.

Soit U un ouvert de M , domaine du système de coordonnées $(x^i)_{1 \leq i \leq n}$ sur M , et au dessus duquel E est trivial. Notons $\varepsilon_i = \frac{\partial}{\partial x^i}$, $1 \leq i \leq n$, et considérons un repère de sections de E au dessus de U noté (ε_α) , $n+1 \leq \alpha \leq n+m$. Si $\xi \in \pi^{-1}(U)$ et $x = \pi(\xi)$, on écrit $\xi = y^\alpha \varepsilon_\alpha(x)$; $(x^i, y^\alpha)_{i,\alpha}$ est alors un système de coordonnées sur $\pi^{-1}(U)$.

Soient $x \in U$, $\xi = \xi^\alpha \varepsilon_\alpha \in \pi^{-1}(x)$ et $X = X^i \varepsilon_i$ un champ de vecteurs tangents à U . Le relèvement horizontal de $X|_x$ en ξ est l'élément $X^H(\xi) \in T_\xi E$ défini par

$$(2.1) \quad X^H(\xi) = X^i(x) \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_\xi - \xi^\alpha \Gamma_{i\alpha}^\beta \frac{\partial}{\partial y^\beta} \Big|_\xi \right),$$

où les $\Gamma_{i\alpha}^\beta$, $i \in \{1, \dots, n\}$ et $\alpha, \beta \in \{n+1, \dots, n+m\}$ désignent les symboles de Christoffel de la connexion $\tilde{\nabla}$ dans le système de coordonnées (x^i, y^α) .

Sur l'ouvert $\pi^{-1}(U)$, on considère alors le repère mobile

$$\mathcal{S} = \{e_i, e_\alpha / i = 1, \dots, n \text{ et } \alpha = n+1, \dots, n+m\},$$

où $e_\alpha = \frac{\partial}{\partial y^\alpha}$ et e_i est le relèvement horizontal de ε_i . Ainsi

$$(2.2) \quad e_i = \frac{\partial}{\partial x^i} - y^\alpha \Gamma_{i\alpha}^\beta \frac{\partial}{\partial y^\beta}.$$

On définit sur la variété E une métrique Riemannienne G en posant

$$(2.3) \quad G(e_i, e_j) = g(\varepsilon_i, \varepsilon_j), \quad G(e_\alpha, e_\beta) = \tilde{g}(\varepsilon_\alpha, \varepsilon_\beta), \quad G(e_i, e_\alpha) = 0.$$

On dispose alors, sur la variété E , de la connexion de Levi-Civita associée à la métrique G et de la connexion D de Sasaki [9] et [10] définie par

$$(2.4) \quad D_{e_i}e_j = \Gamma_{ij}^k e_k, \quad D_{e_i}e_\alpha = \Gamma_{i\alpha}^\beta e_\beta, \quad D_{e_\alpha}e_i = D_{e_\alpha}e_\beta = 0,$$

où les Γ_{ij}^k , $i, j, k \in \{1, \dots, n\}$, désignent les symboles de Christoffel de la connexion ∇ dans le système de coordonnées (x^i) . La connexion D est G -métrique et ne coïncide pas avec la connexion de Levi-Civita de G ; la torsion T de D est non nulle. En effet, notant S le tenseur de courbure de $\tilde{\nabla}$, les composantes de T dans le repère mobile $\mathcal{S}$ sont toutes nulles sauf

$$(2.5) \quad T_{ij}^\alpha = -y^\beta S_{\beta ij}^\alpha.$$

Les composantes dans $\mathcal{S}$ du tenseur de courbure $\mathcal{R}$ de D sont données par

$$R_{dcab} = G((D_{e_a}e_b - D_{e_b}e_a - D_{[e_a, e_b]})e_c, e_d)$$

et

$$R_{cab}^d = G^{de} R_{ecab}.$$

Par un calcul direct, on montre qu'en particulier, pour $1 \leq i, j \leq n$ et $n+1 \leq \alpha, \beta, \lambda, \mu \leq n+m$, on a :

$$(2.6) \quad R_{\alpha \beta j}^i = R_{\alpha \beta j}^\lambda = R_{\alpha \beta \mu}^i = R_{\alpha \beta \mu}^\lambda \equiv 0.$$

2- On note $\Sigma = \{\xi \in E / \|\xi\| = 1\}$ le sous-fibré unitaire de E , π_1 la surjection naturelle du fibré Σ sur M , r la fonction $r(\xi) = \|\xi\|$ et ν le champ radial unitaire. Sur l'ouvert $\pi^{-1}(U)$ muni des coordonnées (x^i, y^α) , $1 \leq i \leq n$ et $n+1 \leq \alpha \leq n+m$, le champ ν est donné par

$$\nu = r^{-1} y^\alpha \frac{\partial}{\partial y^\alpha}$$

et l'ouvert $\pi_1^{-1}(U)$ de Σ est donné, comme sous-variété de dimension $n+m-1$ de $\pi^{-1}(U)$, par

$$\tilde{g}_{\alpha\beta} y^\alpha y^\beta = 1.$$

Ce qui, par un calcul direct montre que le champ radial unitaire ν est normal à Σ . De l'expression de ν , celle du relèvement horizontal d'un vecteur $X \in T_x M$ au point $\xi = (x, y^\alpha) \in \Sigma$, donnée par (2.2), et de la définition de la métrique G , on voit que l'espace tangent à Σ au point ξ est une somme directe du sous-espace horizontal $H_\xi E$ de $T_\xi E$ et de l'espace tangent à la fibre de Σ passant par ξ .

Dans tout ce qui suit, le paramètre μ_a sera égal à 0 ou 1 selon que la direction a est verticale ou horizontale. Fixons un repère mobile tangent à E de la forme

$$\mathcal{R} = \{e_i, e_\alpha / i = 1, \dots, n \text{ et } \alpha = n+1, \dots, n+m\},$$

où les e_i sont des champs de vecteurs horizontaux obtenus par relèvement horizontal d'un repère mobile $(\epsilon_i)_{1 \leq i \leq n}$ sur M et où les e_α sont des champs de vecteurs verticaux avec $e_{n+m} = \nu$. On notera

$$\mathcal{R}^* = \{\omega^A, A \leq n+m\}$$

le corepère dual de $\mathcal{R}$. La restriction à Σ des champs e_a , pour $a \leq n + m - 1$, constitue un repère mobile $\mathcal{R}_1$ tangent à Σ et

$$\mathcal{R}_1^* = \{\sigma^a, a \leq n + m - 1\},$$

où σ^a est l'image inverse de ω^a par i , injection canonique de Σ dans E , n'est autre que le corepère dual de $\mathcal{R}_1$.

Appliquons D à e_a , le résultat est une 1-forme sur E à valeurs dans TE dont l'expression dans la repère $\mathcal{R}$ nous permet d'introduire la matrice (ω_B^A) de 1-formes définie par les égalités

$$(2.7) \quad De_A = \omega_A^B \otimes e_B.$$

Du fait que ν est unitaire et puisque D est G -métrique, on voit que

$$G(D_{e_a}\nu, \nu) = 0, \text{ pour } 1 \leq a \leq n + m.$$

On en déduit que, sur Σ_r , le fibré en sphères de rayon r ,

$$(2.8) \quad \omega_{n+m}^{n+m} = 0.$$

D'autre part, si X est un champ de vecteurs verticaux tangents à Σ_r et donc vérifiant $i_*Xr = 0$ sur Σ_r , on aura

$$(2.9) \quad D_{i_*X}\nu = r^{-1}(i_*X.y^\alpha) \frac{\partial}{\partial y^\alpha} + r^{-1}y^\alpha D_{i_*X} \left(\frac{\partial}{\partial y^\alpha} \right) = r^{-1}i_*X.$$

Eu égard à (2.4) qui implique que $D_{i_*X} \left(\frac{\partial}{\partial y^\alpha} \right) = 0$. De même, compte tenu de la définition (2.4) de la connexion D et de l'expression (2.2) du relèvement horizontal d'un champ de vecteurs, si dans U , $\varepsilon_i = \varepsilon_i^j \frac{\partial}{\partial x^j}$ et $e_i = (\varepsilon_i)^H$, on voit que

$$D_{e_j}\nu = r^{-1}\varepsilon_j^h \left(\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^h} - y^\lambda \Gamma_{h\lambda}^\mu \frac{\partial y^\alpha}{\partial y^\mu} \right) \frac{\partial}{\partial y^\alpha} + r^{-1}y^\alpha \varepsilon_j^h \Gamma_{h\alpha}^\mu \frac{\partial}{\partial y^\mu}.$$

D'où

$$(2.10) \quad D_{e_j}\nu = r^{-1}\varepsilon_j^h \left[-y^\lambda \Gamma_{h\lambda}^\mu \delta_\mu^\alpha \frac{\partial}{\partial y^\alpha} + y^\alpha \Gamma_{h\alpha}^\mu \frac{\partial}{\partial y^\mu} \right] = 0.$$

Ainsi, compte tenu de (2.9) et (2.10),

$$(2.11) \quad D_{e_a}\nu = (1 - \mu_a)r^{-1}e_a \quad \text{pour } a \leq n + m - 1.$$

Reportons dans (2.7), il en découle que, sur Σ_r , on a

$$(2.12) \quad \omega_{n+m}^a = (1 - \mu_a)r^{-1}\omega^a \text{ pour } a \leq n + m - 1$$

et par suite, compte tenu de (2.8),

$$(2.13) \quad D_\nu\nu = 0.$$

D'autre part, la compatibilité de la connexion D avec la métrique G montre que

$$G(D_{e_b}e_a, \nu) = -G(e_a, D_{e_b}\nu)$$

ce qui, compte tenu de (2.12), implique que

$$(2.14) \quad \omega_a^{n+m}(e_b) = -(1 - \mu_b)r^{-1}G_{ab} \text{ pour } a, b \leq n + m - 1.$$

A présent, on donne les composantes du tenseur de courbure $\tilde{\mathcal{R}}$ de Σ . Utilisons l'équation de Gauss et (2.14) on voit que

$$\tilde{R}_{dcab} = R_{dcab} + (1 - \mu_a)(1 - \mu_b)(G_{ad}G_{bc} - G_{ac}G_{bd}).$$

Ainsi, tenons compte de (2.6), nous obtenons la valeur des composantes qui seront utilisées ultérieurement :

$$(2.15) \quad \tilde{R}_{\alpha\beta\gamma}^j = \tilde{R}_{\alpha\beta i}^j = \tilde{R}_{\alpha\beta i}^\gamma = 0, \quad n+1 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq n+m-1 \text{ et } 1 \leq i, j \leq n,$$

et

$$(2.16) \quad \tilde{R}_{\alpha\beta\mu}^\lambda = \delta_\beta^\lambda G_{\alpha\mu} - \delta_\mu^\lambda G_{\alpha\beta}, \quad n+1 \leq \alpha, \beta, \lambda, \mu \leq n+m-1.$$

3 Mise en équation

Dans cette partie, on donnera l'équation de la courbure moyenne. On conserve toutes les notations du dernier paragraphe de la section précédente. Soit $u \in \mathcal{C}^2(\Sigma)$ une fonction qu'on prolonge à E_* en la maintenant radialement constante. On considère l'application $\mathcal{Y}$ de Σ dans E telle que

$$\mathcal{Y}(\xi) = e^{u(\xi)}\xi, \quad \text{pour } \xi \in \Sigma.$$

La différentielle $D\mathcal{Y}$ de $\mathcal{Y}$ est une section de $T^*\Sigma \otimes TE$ qu'on peut écrire sous la forme

$$D\mathcal{Y} = \sigma^a \otimes E_a, \quad \text{où pour } a \leq n+m-1, \quad E_a = D\mathcal{Y}(e_a).$$

Les champs de vecteurs $\{E_a, a \leq n+m-1\}$ définissent un repère mobile tangent au graphe $\mathcal{Y}$. Un calcul direct donne

$$E_a = e_a + e^u D_a u \nu$$

et le champ unitaire normal à $\mathcal{Y}$ est donc

$$\tilde{\nu} = f(\nu - e^u D^a u e_a), \quad f = (1 + e^{2u} D_a u D^a u)^{-\frac{1}{2}}.$$

La métrique H induite par G sur $\mathcal{Y}$ est

$$H = H_{ab} \sigma^a \otimes \sigma^b, \quad \text{où } H_{ab} = G(E_a, E_b) = G_{ab} + e^{2u} D_a u D_b u$$

et la résolution de l'équation $H^{ab} H_{bc} = \delta_c^a$ donne les composantes contravariantes de celle-ci, on vérifie que :

$$H^{ab} = G^{ab} - f^2 e^{2u} D^a u D^b u.$$

Enfin, rappelons qu'avec le choix ci-dessus du champ normal unitaire $\tilde{\nu}$, la courbure moyenne $\mathcal{M}_{\mathcal{Y}}$ de $\mathcal{Y}$ est donnée par

$$\mathcal{M}_{\mathcal{Y}} = H^{ab}G(D_{E_a}\tilde{\nu}, E_b).$$

Dans le corepère $\mathcal{R}^*$, la différentielle de la fonction u est donné par

$$du = \sum_{a=1}^{n+m-1} D_a u \omega^a.$$

La composante $D_a u$ est homogène de degré 0 ou -1 selon que la direction a est horizontale ou verticale, i.e. $D_a u$ est homogène de degré $(\mu_a - 1)$. De même, on a

$$D_{ab}u = D^2u(e_a, e_b) = (D_{e_a}Du)(e_b).$$

D'où

$$D_{ab}u = D_{e_a}(Du(e_b)) - Du(D_{e_a}e_b)$$

et on vérifie que la composante $D_{ab}u$ est homogène de degré $(\mu_a + \mu_b - 2)$. En particulier, sur $\mathcal{Y}$, on peut écrire

$$D_{a\nu}u = D_{e_a}(Du(\nu)) - Du(D_{e_a}\nu) = -Du(D_{e_a}\nu).$$

La dernière égalité découle du fait que u est une fonction radialement constante. La relation (2.11) implique alors que

$$(3.1) \quad D_{a\nu}u = -(1 - \mu_a)e^{-u}D_a u \text{ pour } a \leq n + m - 1.$$

Tenons compte de la relation (2.13), un calcul analogue montre que

$$(3.2) \quad D_{\nu\nu}u = 0.$$

À présent, de la nature du prolongement de u qui implique que $D_{\nu}u = 0$, et la relation (2.13) qui dit que $D_{\nu}\nu = 0$, on voit que

$$D_{E_a}E_b = D_{e_a}(e_b + e^u D_b u \nu) + e^u D_a D_{\nu}e_b + e^{2u} D_a u (\nu \cdot D_b u) \nu.$$

Le fait que les composantes de la torsion de la forme $T_{n+m}^a{}_b$ sont identiquement nulles et la relation (2.11) permettent d'écrire :

$$D_{\nu}e_b = D_{e_b}\nu = (1 - \mu_b)e^{-u}e_b.$$

D'autre part,

$$D_{\nu}(D_b u) = D_{\nu b}u + Du(D_{\nu}e_b) = -(1 - \mu_b)e^{-u}D_b u + Du((1 - \mu_b)e^{-u}e_b).$$

La dernière égalité est une conséquence de (3.1) et la relation ci-dessus. Ainsi, on voit que $D_{\nu}(D_b u) = 0$ et donc

$$D_{E_a}E_b = D_{e_a}e_b + e^u \left[D_{e_a}(D_b u) + D_a u D_b u \right] \nu + e^u D_b u D_{e_a}\nu + (1 - \mu_b)D_a u e_b.$$

Une égalité qui, compte tenu de (2.11), s'écrit sous la forme

$$(3.3) \quad D_{E_a} E_b = D_{e_a} e_b + e^u \left[D_{e_a} (D_b u) + D_a u D_b u \right] \nu + D_b u (1 - \mu_a) e_a + D_a u (1 - \mu_b) e_b.$$

Or,

$$D_{e_a} e_b = \sum_1^{n+m-1} \omega_b^c(e_a) e_c + \omega_b^{n+m}(e_a) \nu = \sum_1^{n+m-1} \omega_b^c(e_a) e_c - (1 - \mu_a) e^{-u} G_{ab} \nu$$

Donc, tenons compte de (2.14), on obtient

$$D_{e_a} e_b = \sum_1^{n+m-1} \omega_b^c(e_a) e_c - (1 - \mu_a) e^{-u} G_{ab} \nu.$$

Par suite, la définition de la dérivée covariante permet d'écrire

$$D_{e_a} (D_b u) = D_{ab} u + Du (D_{e_a} e_b) = D_{ab} u + \sum_1^{n+m-1} \omega_b^c(e_a) D_c u.$$

De sorte que

$$D_{e_a} e_b + e^u (e_a D_b u) \nu = \sum_1^{n+m-1} \omega_b^c(e_a) E_c + e^{-u} \left[e^{2u} D_{ab} u - (1 - \mu_a) G_{ab} \right] \nu.$$

Reportons dans (3.3), compte tenu du fait que $E_a = e_a + e^u D_a u \nu$, la relation qui en résulte peut s'écrire sous la forme :

$$\begin{aligned} D_{E_a} E_b &= \sum_1^{n+m-1} \omega_b^c(e_a) E_c + D_b u (1 - \mu_a) E_a + D_a u (1 - \mu_b) E_b \\ &\quad + e^{-u} \left[- (1 - \mu_a) H_{ab} + \mu_b e^{2u} D_a u D_b u + e^{2u} D_{ab} u \right] \nu \end{aligned}$$

et par suite, eu égard au fait que $G(E_c, \tilde{\nu}) = 0$ pour $c \leq n + m - 1$, on obtient :

$$G(D_{E_a} E_b, \tilde{\nu}) = f e^{-u} \left[- (1 - \mu_a) H_{ab} + \mu_b e^{2u} D_a u D_b u + e^{2u} D_{ab} u \right].$$

Ainsi et puisque $G(D_{E_a} \tilde{\nu}, E_b) = -G(D_{E_a} E_b, \tilde{\nu})$, on trouve que

$$f^{-1} e^u \mathcal{M}_y = H^{ab} \left[(1 - \mu_a) H_{ab} - \mu_b e^{2u} D_a u D_b u - e^{2u} D_{ab} u \right].$$

Prenons l'image inverse sur Σ de cette équation, tenons compte de l'homogénéité des dérivées covariantes de u et notons $\tilde{D}^a u = e^{\mu_a u} D^a u$ et $\tilde{D}^{ab} u = e^{(\mu_a + \mu_b) u} D^{ab} u$, on obtient

$$A^{ab}(u) \tilde{D}_{ab} u = -v_2 + (m - 1)(1 + v) - (1 + v)^{\frac{3}{2}} e^u \mathcal{M}_y(e^u \xi),$$

où $A^{ab}(u) = (1 + v) G^{ab} - \tilde{D}^a u \tilde{D}^b u$ et

$$v = v_1 + v_2, \quad v_1 = (1 - \mu_a) \tilde{D}_a u \tilde{D}^a u, \quad v_2 = \mu_a \tilde{D}_a u \tilde{D}^a u.$$

Ainsi, la recherche d'un graphe radial à courbure moyenne prescrite K revient à résoudre sur Σ l'équation elliptique suivante :

$$(3.4) \quad A^{ab}(u) \tilde{D}_{ab} u = -v_2 + (m - 1)(1 + v) - (1 + v)^{\frac{3}{2}} e^u K(e^u \xi).$$

4 Estimations a priori

Lemme 1. Soient $K \in \mathcal{C}^\infty(E_*)$ une fonction partout strictement positive et $u \in \mathcal{C}^3(\Sigma)$ une solution de l'équation

$$(4.1) \quad A^{ab} \tilde{D}_{ab} u = -v_2 + (m-1)(1+v) - (1+v)^{\frac{3}{2}} e^u K(e^u \xi) \equiv F$$

telle qu'il existe deux réels strictement positifs r_1 et r_2 vérifiant $r_1 \leq e^u \leq r_2$. Notons $\Sigma_{r_1, r_2} = \{\xi \in E; r_1 \leq \|\xi\| \leq r_2\}$ et r la fonction $r(\xi) = \|\xi\|$, et supposons qu'en tout point de Σ où $v \geq 1$, on ait

$$(4.2) \quad (\mu_a + \mu_b) G^{ab} \tilde{D}_{ab} u \leq -\alpha \sqrt{v},$$

où l'on a noté

$$(4.3) \quad \alpha = 2 \sup_{\xi \in \Sigma} \left[\sup_{\Sigma_{r_1, r_2}} \left| r \frac{\partial [r K(r \xi)]}{\partial r} \right| \right].$$

Alors il existe une constante positive C_1 ne dépendant que de (M, g) , $(E, \tilde{g})$, r_1 , r_2 , $\max_{\Sigma_{r_1, r_2}} K$ et $\|K\|_{\mathcal{C}^1(\Sigma_{r_1, r_2})}$ telle que $|Du| \leq C_1$ partout dans Σ .

Démonstration. Soient $u \in \mathcal{C}^3(\Sigma)$ une solution de (4.1), l un réel strictement positif fixé ultérieurement et Γ la fonctionnelle définie, sur Σ , par

$$(4.4) \quad \Gamma(u) = (1+v)e^{-lu}.$$

En un point $\xi \in \Sigma$ où $\Gamma(u)$ atteint son maximum, on a :

$$(4.5) \quad \frac{D_a \Gamma}{\Gamma} = \frac{D_a v}{1+v} - l D_a u = 0$$

et

$$A^{ab} \tilde{D}_{ab} \Gamma \leq 0$$

c'est-à-dire, tenons compte de (4.1),

$$(4.6) \quad A^{ab} \tilde{D}_{ab} v - \frac{A^{ab} \tilde{D}_a v \tilde{D}_b v}{1+v} - l(1+v)F \leq 0.$$

Or,

$$\begin{aligned} A^{ab} \tilde{D}_{ab} v &= 4v_2 A^{ab} \tilde{D}_a u \tilde{D}_b u + 2v_2 A^{ab} \tilde{D}_{ab} u + 8A^{ab} \mu_c \tilde{D}_{ac} u \tilde{D}^c u \tilde{D}_b u \\ &\quad + 2A^{ab} \tilde{D}_a^c u \tilde{D}_{bc} u + 2A^{ab} \tilde{D}_{abc} u \tilde{D}^c u, \end{aligned}$$

où l'on a noté $\tilde{D}_{abc} u = e^{(\mu_a + \mu_b + \mu_c)u} D_{abc} u$. Une permutation de l'ordre des indices de dérivation covariante dans le terme des dérivées troisièmes, celle-ci génère des termes en torsion et en courbure, montre que

$$\begin{aligned} (4.7) \quad A^{ab} \tilde{D}_{ab} v &= 4v_2 v + 2v_2 F + 8A^{ab} \mu_c \tilde{D}_{ac} u \tilde{D}^c u \tilde{D}_b u \\ &\quad + 2A^{ab} \tilde{D}_a^c u \tilde{D}_{bc} u + 2A^{ab} \tilde{D}_{cab} u \tilde{D}^c u + 4E_1 + E_2, \end{aligned}$$

où les termes E_1 et E_2 sont donnés par

$$E_1 = -A^{ab}e^{(\mu_a+\mu_b+\mu_c)u}T_{ac}^dD_{bd}u\tilde{D}^cu$$

et

$$E_2 = -2A^{ab}e^{(\mu_a+\mu_b+\mu_c)u}\left(\tilde{R}^d{}_{bac} + D_aT_{bc}^d - T_{ac}^hT_{hb}^d\right)D_du\tilde{D}^cu.$$

A présent, on dérive une fois l'équation (4.1), il vient

$$A^{ab}\tilde{D}_{cab}u + (\mu_a + \mu_b)A^{ab}\tilde{D}_{ab}u\tilde{D}_cu + (\tilde{D}_cA^{ab})\tilde{D}_{ab}u = \tilde{D}_cF.$$

Développons $(\tilde{D}_cA^{ab})$ et saturons par $\tilde{D}^cu$, on obtient :

$$(4.8) \quad \begin{aligned} A^{ab}\tilde{D}_{cab}u\tilde{D}^cu &= \tilde{D}_cF\tilde{D}^cu - v(\mu_a + \mu_b)A^{ab}\tilde{D}_{ab}u - \tilde{D}_cv\tilde{D}^cuG^{ab}\tilde{D}_{ab}u \\ &+ v(\mu_a + \mu_b)\tilde{D}^au\tilde{D}^bu\tilde{D}_{ab}u + \tilde{D}_c{}^au\tilde{D}^cu\tilde{D}^bu\tilde{D}_{ab}u + \tilde{D}^au\tilde{D}^cu\tilde{D}_c{}^bu\tilde{D}_{ab}u. \end{aligned}$$

D'après (4.1), on peut écrire $G^{ab}\tilde{D}_{ab}u = \frac{F + \tilde{D}^au\tilde{D}^bu\tilde{D}_{ab}u}{1+v}$. Il s'en suit que

$$\tilde{D}_cv\tilde{D}^cu\tilde{D}_a{}^au = \frac{F}{1+v}\tilde{D}_cv\tilde{D}^cu + \frac{\tilde{D}^au\tilde{D}^bu\tilde{D}_{ab}u\tilde{D}_cv\tilde{D}^cu}{1+v}.$$

Développons $\tilde{D}_cv$ dans le second terme du membre de droite, il vient

$$\tilde{D}_cv\tilde{D}^cu\tilde{D}_a{}^au = \frac{F\tilde{D}_cv\tilde{D}^cu}{1+v} + \frac{2\left(\tilde{D}^au\tilde{D}^bu\tilde{D}_{ab}u\right)^2}{1+v} + \frac{2v_2v}{1+v}\tilde{D}^au\tilde{D}^bu\tilde{D}_{ab}u.$$

Or

$$(4.9) \quad \tilde{D}_av = 2\tilde{D}^bu\tilde{D}_{ab}u + 2v_2\tilde{D}_au.$$

Il en découle que

$$(4.10) \quad \begin{aligned} \tilde{D}_cv\tilde{D}^cuG^{ab}\tilde{D}_{ab}u &= \frac{F}{1+v}\tilde{D}_cv\tilde{D}^cu + \frac{2}{1+v}\left(\tilde{D}^au\tilde{D}^bu\tilde{D}_{ab}u\right)^2 \\ &+ \frac{vv_2}{1+v}\tilde{D}^av\tilde{D}_au - \frac{2v(v_2)^2}{1+v}. \end{aligned}$$

D'autre part, la définition des composantes A^{ab} montre que

$$(4.11) \quad G^{ab} = \frac{A^{ab} + \tilde{D}^au\tilde{D}^bu}{1+v}.$$

De ce fait, la somme des deux derniers termes du membre de droite de (4.8) s'écrit sous la forme :

$$\begin{aligned} \tilde{D}_c{}^au\tilde{D}^cu\tilde{D}^bu\tilde{D}_{ab}u + \tilde{D}^au\tilde{D}^cu\tilde{D}_c{}^bu\tilde{D}_{ab}u &= \frac{2\left(\tilde{D}^au\tilde{D}^bu\tilde{D}_{ab}u\right)^2}{1+v} \\ &+ \frac{A^{ad}\tilde{D}_{cd}u\tilde{D}^cu\tilde{D}^bu\tilde{D}_{ab}u}{1+v} + \frac{A^{ad}\tilde{D}_{cd}u\tilde{D}^cu\tilde{D}^bu\tilde{D}_{ba}u}{1+v}. \end{aligned}$$

Or, un simple calcul nous permet d'établir la commutation suivante :

$$(4.12) \quad D_{cd}u = D_{dc}u - T_{cd}^e D_e u.$$

Il en découle que

$$\begin{aligned} \tilde{D}_c^a u \tilde{D}^c u \tilde{D}^b u \tilde{D}_{ab} u + \tilde{D}^a u \tilde{D}^c u \tilde{D}_c^b u \tilde{D}_{ab} u &= \frac{2 \left(\tilde{D}^a u \tilde{D}^b u \tilde{D}_{ab} u \right)^2}{1+v} \\ &+ \frac{2A^{ab}(\tilde{D}_{ac} u \tilde{D}^c u)(\tilde{D}_{bd} u^d)}{\tilde{D}} u) 1+v + E_3 + E_4, \end{aligned}$$

où l'on a noté

$$E_3 = -\frac{3}{1+v} A^{ab} e^{(\mu_a + \mu_c)u} T_{ca}^e D_e u \tilde{D}^c u \tilde{D}^d u \tilde{D}_{bd} u$$

et

$$(4.13) \quad E_4 = \frac{1}{1+v} A^{ab} e^{(\mu_a + \mu_b + \mu_c + \mu_d)u} T_{cb}^e T_{da}^f D_e u D_f u \tilde{D}^c u \tilde{D}^d u.$$

Ainsi, tenons compte de (4.9), on vérifie que

$$\begin{aligned} (4.14) \quad \tilde{D}_c^a u \tilde{D}^c u \tilde{D}^b u \tilde{D}_{ab} u + \tilde{D}^a u \tilde{D}^c u \tilde{D}_c^b u \tilde{D}_{ab} u &= \frac{2 \left(\tilde{D}^a u \tilde{D}^b u \tilde{D}_{ab} u \right)^2}{1+v} \\ &+ \frac{A^{ab} \tilde{D}_a v \tilde{D}_b v}{2(1+v)} + \frac{2(v_2)^2 v}{1+v} - \frac{2v_2}{1+v} A^{ab} \tilde{D}_a v \tilde{D}_b u + E_3 + E_4. \end{aligned}$$

D'autre part, utilisons à nouveau (4.9), on obtient la forme suivante pour le terme E_3 :

$$\begin{aligned} E_3 &= -\frac{3}{2(1+v)} A^{ab} e^{(\mu_a + \mu_c)u} T_{ca}^e D_e u \tilde{D}^c u \tilde{D}_b v \\ &+ \frac{3v_2}{1+v} A^{ab} e^{(\mu_a + \mu_c)u} T_{ca}^e D_e u \tilde{D}^c u \tilde{D}_b u. \end{aligned}$$

Une forme, qui compte tenu de (4.5) et de la définition des composantes A^{ab} , permet de vérifier que

$$(4.15) \quad E_3 = \left(-\frac{3l}{2} + \frac{3v_2}{1+v} \right) e^{(\mu_a + \mu_c)u} T_{ca}^e D_e u \tilde{D}^c u \tilde{D}^a u.$$

Reportons (4.10) et (4.14) dans (4.8), tenons compte à nouveau de la définition des composantes A^{ab} , on obtient :

$$\begin{aligned} A^{ab} \tilde{D}_{cab} u \tilde{D}^c u &= \frac{A^{ab} \tilde{D}_a v \tilde{D}_b v}{2(1+v)} + \tilde{D}_c F \tilde{D}^c u - \frac{F \tilde{D}_a v \tilde{D}^a u}{1+v} - \frac{v_2(2+v)}{1+v} \tilde{D}_a v \tilde{D}^a u \\ &- v(1+v)(\mu_a + \mu_b) G^{ab} \tilde{D}_{ab} u + 4v\mu_a \tilde{D}^a u \tilde{D}^b u \tilde{D}_{ab} u + \frac{4v(v_2)^2}{1+v} + E_3 + E_4. \end{aligned}$$

Une égalité qui, compte tenu de (4.9), s'écrit sous la forme :

$$\begin{aligned} A^{ab} \tilde{D}_{cab} u \tilde{D}^c u &= \frac{A^{ab} \tilde{D}_a v \tilde{D}_b v}{2(1+v)} + \tilde{D}_c F \tilde{D}^c u - \frac{F \tilde{D}_a v \tilde{D}^a u}{1+v} - \frac{v_2(2+v)}{1+v} \tilde{D}_a v \tilde{D}^a u \\ &\quad - v(1+v)(\mu_a + \mu_b) G^{ab} \tilde{D}_{ab} u + 2v\mu_a \tilde{D}^a v \tilde{D}_a u - \frac{4(vv_2)^2}{1+v} + E_3 + E_4. \end{aligned}$$

Multiplions cette relation par 2 et reportons dans (4.7), l'égalité qui en résulte s'écrit sous la forme :

$$\begin{aligned} (4.16) \quad A^{ab} \tilde{D}_{ab} v - \frac{A^{ab} \tilde{D}_a v \tilde{D}_b v}{(1+v)} &= 2\tilde{D}_a F \tilde{D}^a u - 2\frac{F \tilde{D}_a v \tilde{D}^a u}{1+v} - \frac{2v_2(2+v)}{1+v} \tilde{D}_a v \tilde{D}^a u \\ &\quad - 2v(1+v)(\mu_a + \mu_b) G^{ab} \tilde{D}_{ab} u + 8A^{ab} \mu_c \tilde{D}_{ac} u \tilde{D}^c u \tilde{D}_b u + 4v\mu_a \tilde{D}_a v \tilde{D}^a u \\ &\quad + 2v_2 F + 4vv_2 - \frac{8(vv_2)^2}{1+v} + 2A^{ab} \tilde{D}_a^c u \tilde{D}_{bc} u + 4E_1 + E_2 + 2E_3 + 2E_4. \end{aligned}$$

La définition des composantes A^{ab} montre, à nouveau, que

$$2\mu_c A^{ab} \tilde{D}_{ac} u \tilde{D}^c u \tilde{D}_b u = (\mu_a + \mu_b) \tilde{D}^a u \tilde{D}^b u \tilde{D}_{ab} u.$$

D'autre part, d'après (4.9), on obtient :

$$(4.17) \quad (\mu_a + \mu_b) \tilde{D}^a u \tilde{D}^b u \tilde{D}_{ab} u = 2\mu_a \tilde{D}^a u \tilde{D}^b u \tilde{D}_{ab} u = \mu_a \tilde{D}^a u \tilde{D}_a v - 2(v_2)^2.$$

Reportons dans (4.16), on obtient :

$$\begin{aligned} A^{ab} \tilde{D}_{ab} v - \frac{A^{ab} \tilde{D}_a v \tilde{D}_b v}{(1+v)} &= 2\tilde{D}_c F \tilde{D}^c u - 2\frac{F \tilde{D}_a v \tilde{D}^a u}{1+v} - \frac{2v_2(2+v)}{1+v} \tilde{D}_a v \tilde{D}^a u \\ &\quad - 2v(1+v)(\mu_a + \mu_b) G^{ab} \tilde{D}_{ab} u + 4v\mu_a \tilde{D}_a v \tilde{D}^a u + 4\mu_a \tilde{D}^a u \tilde{D}_a v + 2v_2 F \\ &\quad + 4v_2(v_1 - v_2) - \frac{8(vv_2)^2}{1+v} + 2A^{ab} \tilde{D}_a^c u \tilde{D}_{bc} u + 4E_1 + E_2 + 2E_3 + 2E_4. \end{aligned}$$

Supposons que

$$(4.18) \quad v(\xi) \geq 1.$$

Tenons compte de (4.2) et (4.5), on voit que

$$\begin{aligned} (4.19) \quad A^{ab} \tilde{D}_{ab} v - \frac{A^{ab} \tilde{D}_a v \tilde{D}_b v}{(1+v)} &\geq 2\tilde{D}_c F \tilde{D}^c u - 2lvF + 2l(1+v)vv_2 - 8v(v_2)^2 \\ &\quad + 2(m+l)vv_2 + 4lv_2 + 2\alpha(1+v)v^{\frac{3}{2}} - 2(1+v)^{\frac{3}{2}}v_2e^u K(e^u \xi) \\ &\quad + 2v_1v_2 - \frac{8(v_2)^2}{1+v} + 2A^{ab} \tilde{D}_a^c u \tilde{D}_{bc} u + 4E_1 + E_2 + 2E_3 + 2E_4. \end{aligned}$$

Remarquons que l'égalité (4.17) implique aussi la suivante :

$$\tilde{D}_c(v_2)\tilde{D}^c u = \mu_a \tilde{D}_a v \tilde{D}^a u + 2v_2(v - v_2)$$

de sorte que le développement de $\tilde{D}_c F \tilde{D}^c u$ donne

$$\begin{aligned} 2\tilde{D}_c F \tilde{D}^c u &= -4v_2(v - v_1) - 2\mu_a \tilde{D}_a v \tilde{D}^a u + 2(m-1)\tilde{D}_a v \tilde{D}^a u \\ &\quad - \sqrt{1+v} e^u \left[3K(e^u \xi) \tilde{D}_a v \tilde{D}^a u + 2(1+v)(\tilde{D}_c K)(e^u \xi) \tilde{D}^c u \right] \\ &\quad - 2v(1+v)^{\frac{3}{2}} e^u \frac{\partial[\rho K(\rho \xi)]}{\partial \rho}(e^u \xi). \end{aligned}$$

Utilisons (4.5), on montre que

$$\begin{aligned} 2\tilde{D}_c F \tilde{D}^c u - 2lvF &= l(1+v)F - l(m-1)(1+v)^2 + l(1+v)v_2 \\ &\quad - 2(1+v)^{\frac{3}{2}} e^u \left[v \frac{\partial[\rho K(\rho \xi)]}{\partial \rho}(e^u \xi) + (\tilde{D}_c K)(e^u \xi) \tilde{D}^c u \right] \\ &\quad - 4(v_2)^2 - 2lv_2 + l(1+v)^{\frac{3}{2}} e^u K(e^u \xi). \end{aligned}$$

Reportons cette égalité dans (4.19), la relation qui en résulte se transforme comme suit :

$$\begin{aligned} A^{ab} \tilde{D}_{ab} v - \frac{A^{ab} \tilde{D}_a v \tilde{D}_b v}{(1+v)} - l(1+v)F &\geq l(1+v)^{\frac{3}{2}} e^u K(e^u \xi) + 2(v_2)^2 \\ &\quad + \frac{8v_2(1+v_1)}{1+v} + l(1+v)v_2 + 2(m+5)vv_2 + 8(1+v)v_1v_2 \\ &\quad - l(m-1)(1+v)^2 - 2(1+v)^{\frac{3}{2}} e^u (\tilde{D}_a K)(e^u \xi) \tilde{D}^a u \\ &\quad + 2v(1+v) \left[\alpha \sqrt{v} - \sqrt{1+v} e^u \frac{\partial[\rho K(\rho \xi)]}{\partial \rho}(e^u \xi) \right] \\ &\quad + 2(1+v)^{\frac{3}{2}} v_2 \left[(l-4)\sqrt{1+v} - e^u K(e^u \xi) \right] \\ &\quad + 2A^{ab} \tilde{D}_a^c u \tilde{D}_{bc} u + 4E_1 + E_2 + 2E_3 + 2E_4. \end{aligned}$$

Supposons que $l \geq l_0 = 4 + r_2 \max_{\Sigma_{r_1, r_2}} K$, tenons compte du choix (4.3) de α et minorons par 0 les termes positifs, l'égalité précédente permet d'écrire

$$\begin{aligned} (4.20) \quad A^{ab} \tilde{D}_{ab} v - \frac{A^{ab} \tilde{D}_a v \tilde{D}_b v}{(1+v)} - l(1+v)F &\geq -l(m-1)(1+v)^2 + 2A^{ab} \tilde{D}_a^c u \tilde{D}_{bc} u \\ &\quad - 2(1+v)^2 e^u \|\tilde{D}K\|_\infty + 4E_1 + E_2 + 2E_3 + 2E_4. \end{aligned}$$

Or, $|E_2| \leq C_1 v^2$, où C_1 est fonction de $\|\mathcal{T}\|_\infty$, $\|\nabla \mathcal{T}\|_\infty$, $\|\tilde{\mathcal{R}}\|_\infty$ et $\|u\|_\infty$ et puisque, d'après (4.13), on sait que $|E_4| \leq C'_1 v^2$ et compte tenu de (4.15), on a : $|E_3| \leq C_2 l v^{\frac{3}{2}}$, où les

constantes C'_1 et C_2 ne sont fonction que de $\|\mathcal{T}\|_\infty$ et $\|u\|_\infty$, l'inégalité (4.20) implique l'existence d'une constante positive C_3 telle que

$$A^{ab}\tilde{D}_{ab}v - \frac{1}{(1+v)}A^{ab}\tilde{D}_av\tilde{D}_bv + l(1+v)F \geq -2C_3l(1+v)^2 \\ + 2A^{ab}\tilde{D}_a^cu\tilde{D}_{bc}u + 4E_1.$$

Reportons cette inégalité dans (4.6), on aboutit à la suivante :

$$(4.21) \quad -C_3l(1+v)^2 + A^{ab}\tilde{D}_a^cu\tilde{D}_{bc}u + 2E_1 \leq 0.$$

Maintenant, on développe le carré suivant :

$$K = G^{ab}G^{cd} \left[\tilde{D}_{ad}u - \epsilon\tilde{D}_au\tilde{D}^eu\tilde{D}_{ed}u - e^{(\mu_a+\mu_e)u}T_{ae}^l\tilde{D}^euG_{ld} \right] \\ \left[\tilde{D}_{bc}u - \epsilon\tilde{D}_bu\tilde{D}^eu\tilde{D}_{ec}u - e^{(\mu_b+\mu_e)u}T_{be}^l\tilde{D}^euG_{lc} \right]$$

avec $\epsilon = \frac{1}{v}$ pour voir que

$$(1+v)K = A^{ab}\tilde{D}_a^cu\tilde{D}_{bc}u + (1+v)e^{(\mu_a+\mu_e+\mu_b+\mu_f)u}G^{ab}G_{cd}T_{ae}^c\tilde{D}^euT_{bf}^d\tilde{D}^fu \\ + 2E_1 - v^{-1}\tilde{D}^au\tilde{D}^bu\tilde{D}_{ac}u\tilde{D}_b^cu + 2v^{-1}e^{(\mu_b+\mu_e)u}T_{be}^d\tilde{D}^eu\tilde{D}^au\tilde{D}^bu\tilde{D}_{ad}u.$$

Il existe, alors, une constante positive C_4 fonction de $\|u\|_\infty$ et $\|\mathcal{T}\|_\infty$, telle que

$$(4.22) \quad A^{ab}\tilde{D}_a^cu\tilde{D}_{bc}u + 2E_1 \geq -C_4(1+v)^2 + v^{-1}\tilde{D}^au\tilde{D}^bu\tilde{D}_{ac}u\tilde{D}_b^cu \\ - 2v^{-1}e^{(\mu_b+\mu_c)u}\tilde{D}^au\tilde{D}^bu\tilde{D}_a^duT_{bc}^e\tilde{D}_eu.$$

Utilisons (4.12), on montre que

$$\tilde{D}^au\tilde{D}^bu\tilde{D}_{ac}u\tilde{D}_b^cu = \tilde{D}^au\tilde{D}^bu\tilde{D}_{ca}u\tilde{D}_b^cu - 2\tilde{D}^au\tilde{D}^bu\tilde{D}_a^cu e^{(\mu_b+\mu_c)u}T_{bc}^e\tilde{D}_eu \\ + G^{cd}\tilde{D}^au\tilde{D}^bu e^{(\mu_a+\mu_b+\mu_c+\mu_d)u}T_{ac}^e\tilde{D}_euT_{bd}^f\tilde{D}_fu$$

et, donc, d'après (4.9), on aura :

$$\tilde{D}^au\tilde{D}^bu\tilde{D}_{ac}u\tilde{D}_b^cu = \frac{1}{4}\tilde{D}^av\tilde{D}_av - v_2\tilde{D}^av\tilde{D}_au + v(v_2)^2 \\ - (\tilde{D}^bu\tilde{D}^cv - 2v_2\tilde{D}^bu\tilde{D}^cu)e^{(\mu_b+\mu_c)u}T_{bc}^e\tilde{D}_eu \\ + G^{cd}\tilde{D}^au\tilde{D}^bu e^{(\mu_a+\mu_b+\mu_c+\mu_d)u}T_{ac}^e\tilde{D}_euT_{bd}^f\tilde{D}_fu.$$

Ainsi, tenons compte de (4.5), il existe une constante positive C_5 fonction de $\|u\|_\infty$ et $\|\mathcal{T}\|_\infty$, telle que

$$(4.23) \quad \tilde{D}^au\tilde{D}^bu\tilde{D}_{ac}u\tilde{D}_b^cu \geq \frac{l^2}{4}(1+v)^2v - l(1+v)vv_2 - C_5l(1+v)v_2\sqrt{v}.$$

De même, on vérifie que

$$\begin{aligned} 2\tilde{D}^a u \tilde{D}^b u \tilde{D}_{ad} u T_{be}^d \tilde{D}^e u &= T_{be}^d \tilde{D}^e u \tilde{D}^b u \tilde{D}_d u - 2v_2 T_{be}^d \tilde{D}^b u \tilde{D}^e u \tilde{D}_d u \\ &\quad - 2e^{(\mu_a + \mu_d)u} T_{be}^d T_{ad}^f \tilde{D}^a u \tilde{D}^b u \tilde{D}^e u \tilde{D}_f u \end{aligned}$$

et donc (4.5) implique l'existence d'une constante positive C_6 fonction de $\|u\|_\infty$ et $\|\mathcal{T}\|_\infty$, telle que

$$(4.24) \quad |2e^{(\mu_b + \mu_c)u} \tilde{D}^a u \tilde{D}^b u \tilde{D}_a^d u T_{bc}^e \tilde{D}_e u| \leq C_6 l(1+v)v_2 \sqrt{v}.$$

Reportons (4.23) et (4.24) dans (4.22), compte tenu du fait que $v_2 \leq 1+v$, on en déduit que

$$A^{ab} \tilde{D}_a^c u \tilde{D}_{bc} u + 2E_1 \geq (4^{-1}l^2 - l - C_4)(1+v)^2 - lC_7(1+v)^{\frac{3}{2}},$$

où $C_7 = C_5 + C_6$. Une inégalité qui, compte tenu de (4.21), implique

$$(4^{-1}l^2 - lC_3 - l - C_4)\sqrt{1+v} - lC_7 \leq 0.$$

De sorte que, pour l assez grand, on aura : $1+v(\xi) \leq C_8 = (lC_7)^2$. Ainsi, compte tenu de (4.18), $1+v \leq 1+C_8$. La définition (4.4) de la fonctionnelle Γ montre que partout dans Σ , on a :

$$v \leq (1+C_8) \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^l.$$

Le lemme est prouvé.

Lemme 2. Soient $K \in \mathcal{C}^\infty(E_*)$ une fonction partout strictement positive vérifiant l'hypothèse (1.1) du théorème 2. Alors toute solution $u \in C^3(\Sigma)$ d'une équation de la forme

$$(4.25) \quad \sum_{n+1 \leq \alpha, \beta \leq n+m-1} B^{\alpha\beta}(u) D_{\alpha\beta} u = (m-1)(1+v_1) - (1+v_1)^{\frac{3}{2}} e^u K(e^u \xi),$$

où $B^{\alpha\beta} = (1+v_1)G^{\alpha\beta} - D^\alpha u D^\beta u$, vérifie $r_1 \leq e^u \leq r_2$. Si en outre K vérifie l'hypothèse de monotonie (1.2) du théorème 2, il existe alors une constante positive C_0 ne dépendant que de $n, r_1, r_2, \max_{\Sigma_{r_1, r_2}} K$ et $\|K\|_{\mathcal{C}^1(\Sigma_{r_1, r_2})}$ telle que $v_1 \leq C_0$.

Démonstration. Soit $u \in \mathcal{C}^3(\Sigma)$ une solution de (4.25). Soit $\xi \in \Sigma$ un point où u atteint son maximum. Si $u(\xi) > \log(r_2)$, l'hypothèse de croissance (1.1) faite sur K implique qu'au point ξ , on aura

$$0 \geq \tilde{D}_\alpha^\alpha u = (m-1) - e^u K(e^u \xi) > 0$$

ce qui constitue une contradiction. La minoration $u \geq \log(r_1)$ s'obtient par analogie en considérant un point où u atteint son minimum.

A présent, on dérive une fois l'équation (4.25) suivant une direction verticale, il vient

$$B^{\alpha\beta} D_{\lambda\alpha\beta} u + D_\lambda B^{\alpha\beta} D_{\alpha\beta} u = D_\lambda F,$$

où F désigne le second membre de (4.25). Développons $D_\lambda B^{\alpha\beta}$ et saturons par $D^\lambda u$, on obtient,

$$(4.26) \quad B^{\alpha\beta} D_{\lambda\alpha\beta} u D^\lambda u + \Delta_1 u D_\lambda v_1 D^\lambda u - \frac{1}{2} D_\lambda v_1 D^\lambda \tilde{v} = D_\lambda F D^\lambda u,$$

où l'on a noté $\Delta_1 u = G^{\alpha\beta} D_{\alpha\beta} u$. Ce terme peut être exprimé à partir de (4.25) de la manière suivante :

$$G^{\alpha\beta} D_{\alpha\beta} u = \frac{F + D^\alpha u D^\beta u D_{\alpha\beta} u}{1 + v_1}$$

et puisque $D^\beta u D_{\alpha\beta} u = \frac{1}{2} D_\alpha v_1$, on obtient

$$G^{\alpha\beta} D_{\alpha\beta} u = \frac{F}{1 + v_1} + \frac{1}{2} \frac{D^\alpha u D_\alpha v_1}{1 + v_1}.$$

Par suite

$$\Delta_1 u D_\lambda v_1 D^\lambda u = \frac{F}{1 + v_1} D_\lambda v_1 D^\lambda u + \frac{1}{2} \frac{D^\alpha u D^\lambda u D_\alpha v_1 D_\lambda v_1}{1 + v_1}.$$

Mais, d'après l'expression des composantes $B^{\alpha\beta}$ qui implique que

$$(4.27) \quad D^\alpha u D^\beta u = (1 + v_1) G^{\alpha\beta} - B^{\alpha\beta},$$

on peut écrire

$$(4.28) \quad \Delta_1 u D_\lambda v_1 D^\lambda u = \frac{F}{1 + v_1} D_\lambda v_1 D^\lambda u + \frac{1}{2} D_\lambda v_1 D^\lambda v_1 - \frac{1}{2} \frac{B^{\alpha\beta} D_\alpha v_1 D_\beta v_1}{1 + v_1}.$$

D'autre part, et puisque $D_{\lambda\alpha\beta} u = D_{\alpha\beta\lambda} u + \tilde{R}_{\beta\alpha\lambda}^A D_A u$, les expressions (2.15) et (2.16) donnant les composantes de la forme $\tilde{R}_{\beta\alpha\lambda}^A$ du tenseur de courbure, impliquent que

$$(4.29) \quad B^{\alpha\beta} D_{\lambda\alpha\beta} u D^\lambda u = B^{\alpha\beta} D_{\alpha\beta\lambda} u D^\lambda u - (m - 2) v_1 (1 + v_1).$$

Reportons (4.28) et (4.29) dans (4.26) et multiplions par 2, la relation qui en résulte s'écrit sous la forme :

$$(4.30) \quad 2B^{\alpha\beta} D_{\alpha\beta\lambda} u D^\lambda u - \frac{B^{\alpha\beta} D_\alpha v_1 D_\beta v_1}{1 + v_1} = 2(m - 2) v_1 (1 + v_1) + 2D_\lambda F D^\lambda u - \frac{2F D_\lambda v_1 D^\lambda u}{1 + v_1}.$$

Maintenant, on considère la fonctionnelle

$$(4.31) \quad \Gamma(u) = (1 + v_1) e^{lu},$$

où l est un réel strictement positif fixé ultérieurement. En un point $\xi \in \Sigma$ où $\Gamma(u)$ atteint son maximum, on a :

$$(4.32) \quad \text{frac} D_\lambda \Gamma = \frac{D_\lambda v_1}{1 + v_1} + l D_\lambda u = 0$$

et $B^{\alpha\beta} D_{\alpha\beta} \Gamma \leq 0$, c'est-à-dire, tenons compte du fait que u vérifie l'équation (4.25),

$$B^{\alpha\beta} D_{\alpha\beta} v_1 - \frac{B^{\alpha\beta} D_\alpha v_1 D_\beta v_1}{1 + v_1} + l(1 + v_1) F \leq 0.$$

Or,

$$B^{\alpha\beta} D_{\alpha\beta} v_1 = 2B^{\alpha\beta} D_{\alpha\beta\lambda} u D^\lambda u + 2B^{\alpha\beta} D_{\alpha\lambda} u D_\beta^\lambda u.$$

Donc, d'après (4.30) et puisque $(m-2)v_1(1+v_1) \geq 0$, au maximum de Γ , on doit avoir

$$2B^{\alpha\beta} D_{\alpha\lambda} u D_\beta^\lambda u + l(1+v_1)F + 2D_\lambda F D^\lambda u - \frac{2FD_\lambda v_1 D^\lambda u}{1+v_1} \leq 0$$

c'est-à-dire, tenons compte de (4.32),

$$(4.33) \quad 2B^{\alpha\beta} D_{\alpha\lambda} u D_\beta^\lambda u + lF + 3lv_1 F + 2D_\lambda F D^\lambda u \leq 0.$$

Développons $D_\lambda F D^\lambda u$. Compte tenu de (4.32), on vérifie que

$$\begin{aligned} 2D_\lambda F D^\lambda u + 3lv_1 F &= -2(1+v_1)^{\frac{3}{2}} e^u (D_\lambda K)(e^u \xi) D^\lambda u \\ &+ l(m-1)(1+v_1)v_1 - 2v_1(1+v_1)^{\frac{3}{2}} e^u \frac{\partial[\rho K(\rho \xi)]}{\partial \rho} (e^u \xi). \end{aligned}$$

L'hypothèse de croissance (1.2) faite sur K implique donc l'existence d'une constante positive C_1 , fonction de $\|K\|_{\mathcal{C}^1(\Sigma_{r_1, r_2})}$, telle que

$$2D_\lambda F D^\lambda u + 3lv_1 F \geq (l - C_1)(m-1)(1+v_1)v_1.$$

Reportons dans (4.33), on obtient

$$2B^{\alpha\beta} D_{\alpha\lambda} u D_\beta^\lambda u + lF + (l - C_1)(m-1)(1+v_1)v_1 \leq 0$$

et par suite, minorons par 0 les termes positifs, on aboutit à l'inégalité suivante :

$$(4.34) \quad (l - C_1)(m-1)(1+v_1)v_1 - l(1+v_1)^{\frac{3}{2}} e^u K(e^u \xi) \leq 0.$$

Posons $l = 1 + C_1$. Si

$$(4.35) \quad v_1(\xi) \geq 1,$$

l'inégalité (4.34) combinée avec le fait que $m \geq 2$ montre que

$$\sqrt{v_1} \leq 3\sqrt{2}(1+C_1)e^u K(e^u \xi) \leq 3\sqrt{2}r_2(1+C_1)K(e^u \xi).$$

En conséquence, compte tenu de (4.35), on voit que

$$v_1(\xi) \leq C_2 = 1 + 18 \left[r_2(1+C_1) \max_{\Sigma_{r_1, r_2}} K \right]^2.$$

Enfin, usons de la définition (4.31) de la fonctionnelle Γ , on vérifie que, partout dans Σ , on a :

$$v_1 \leq 1 + v_1 \leq C_2 \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^l.$$

Le lemme est prouvé.

5 Preuve des résultats

5.1 Preuve du théorème 1

Les calculs de la première section montrent que la courbure moyenne de Σ_r est

$$\mathcal{M}_{\Sigma_r} = -G^{ab}G(D_{e_a}e_b, \nu) = \frac{m-1}{r}.$$

Définissons $\mathcal{Y}$ sur Σ en posant

$$\mathcal{Y}(\xi) = r\xi \text{ pour tout } \xi \in \Sigma.$$

Le graphe $\mathcal{Y}$ n'est autre que Σ_r et s'il existe un réel $r > 0$ tel que

$$K(r\xi) = (m-1)r^{-1}, \text{ quel que soit } \xi \in \Sigma,$$

alors

$$\mathcal{M}_{\mathcal{Y}}(r\xi) = K(r\xi), \text{ pour tout } \xi \in \Sigma.$$

Ceci montre la suffisance des hypothèses faites sur K dans le théorème 1.

Supposons qu'il existe un graphe radial $\mathcal{Y}$ sur Σ de classe $\mathcal{C}^\infty$ dont la courbure moyenne est égale à K . Ceci est équivalent à dire qu'il existe une fonction $u \in C^\infty(\Sigma)$ vérifiant l'équation (3.4), mise en évidence à la troisième section. Notons

$$r_1 = \min_{\Sigma} e^u \text{ et } r_2 = \max_{\Sigma} e^u.$$

On se place successivement en un point où u atteint son minimum et en un point où u atteint son maximum, on voit que

$$(m-1)(r_1)^{-1} \geq K(r_1) \text{ et } (m-1)(r_2)^{-1} \leq K(r_2).$$

Le résultat devient une conséquence de la continuité de K via le théorème des valeurs intermédiaires.

5.2 Preuve du théorème 2

Pour tout entier naturel k et tout réel α compris entre 0 et 1, on notera par $A^{k,\alpha}(\Sigma)$ l'ensemble des fonctions $u \in \mathcal{C}^{k,\alpha}(\Sigma)$ dont la composante horizontale du gradient est identiquement nulle muni de la norme $\mathcal{C}^{k,\alpha}(\Sigma)$.

La preuve du théorème repose sur le lemme suivant.

Lemme 3. *Soit $w \in A^{k+1,\alpha}(\Sigma)$. Pour tout $u \in \mathcal{C}^{k+2,\alpha}(\Sigma)$, on pose*

$$L[w](u) = \sum_{n+1 \leq \alpha, \beta \leq n+m-1} B^{\alpha\beta}(w) D_{\alpha\beta} u - u,$$

où $B^{\alpha\beta}(w) = (1 + v_1(w))G^{\alpha\beta} - D^\alpha w D^\beta w$ et $v_1(w) = D_\alpha w D^\alpha w$ est le carré de la norme de la composante verticale du gradient de w . L'opérateur $L[w]$ ainsi défini réalise un isomorphisme de $A^{k+2,\alpha}(\Sigma)$ sur $A^{k,\alpha}(\Sigma)$.

Démonstration. Tout d'abord, on applique la méthode de continuité, combinée avec les inégalités de Schauder, pour montrer que pour toute fonction $w \in C^{k+1,\alpha}(\Sigma)$, l'opérateur elliptique $\tilde{L}[w]$ défini, pour $u \in C^{k+2,\alpha}(\Sigma)$, par

$$\tilde{L}[w]u = G^{ij}D_{ij}u + B^{\alpha\beta}(w)D_{\alpha\beta}u - u$$

est un isomorphisme de $C^{k+2,\alpha}(\Sigma)$ sur $C^{k,\alpha}(\Sigma)$. On en déduit que pour toute fonction $w \in A^{k+1,\alpha}(\Sigma)$, l'opérateur $L[w]$ est un isomorphisme de $A^{k+2,\alpha}(\Sigma)$ sur $A^{k,\alpha}(\Sigma)$. En effet, le principe du maximum implique que le noyau de celui-ci est trivial et pour toute fonction $z \in A^{k,\alpha}(\Sigma)$, il existe $u \in C^{k+2,\alpha}(\Sigma)$ telle que

$$(5.1) \quad \tilde{L}[w]u = z,$$

eu égard au fait que $\tilde{L}[w]$ est inversible. Or $z \in A^{k,\alpha}(\Sigma)$, donc $G^{kl}D_{kl}z = 0$. Ainsi, dérivons deux fois (5.1) suivant des directions horizontales k et l et saturons par G^{kl} , compte tenu de l'expression (2.15) donnant les composantes de la courbure de D et puisque les dérivées covariantes horizontales de w sont identiquement nulles, on obtient

$$G^{ij}D_{ij}(G^{kl}D_{kl}u) + B^{\alpha\beta}(w)D_{\alpha\beta}(G^{kl}D_{kl}u) - G^{kl}D_{kl}u = 0$$

ce qui signifie que $G^{kl}D_{kl}u$ est dans le noyau de $\tilde{L}[w]$, donc, ce terme est identiquement nul et par suite (5.1) se réduit à la forme suivante :

$$(5.2) \quad L[w](u) = z.$$

Dérivons l'équation (5.2) par rapport à une direction horizontale $i \in \{1, \dots, n\}$, on obtient

$$B^{\alpha\beta}(w)D_{i\alpha\beta}u + D_i B^{\alpha\beta}(w)D_{\alpha\beta}u - D_i u = 0.$$

Saturons par $D^i u$, on voit que,

$$B^{\alpha\beta}D_{i\alpha\beta}uD^i u + D_i B^{\alpha\beta}(w)D_{\alpha\beta}uD^i u - D_i u D^i u = 0.$$

Tenons compte du fait que $w \in A^{k+1,\alpha}(\Sigma)$, qui implique que

$$D_i B^{\alpha\beta}(w)D_{\alpha\beta}uD^i u = 0,$$

on aboutit à l'égalité suivante

$$(5.3) \quad B^{\alpha\beta}D_{i\alpha\beta}uD^i u - \tilde{v}_2 = 0$$

où $\tilde{v}_2 = D_i u D^i u$ désigne le carré de la norme de la composante horizontale du gradient de u . D'après (2.15), on a $D_{i\alpha\beta}u = D_{\alpha\beta i}u$ et donc l'égalité (5.3) s'écrit

$$(5.4) \quad B^{\alpha\beta}D_{\alpha\beta i}uD^i u - \tilde{v}_2 = 0$$

D'autre part, en un point ξ_0 où $\tilde{v}_2$ atteint son maximum, on a : $B^{\alpha\beta}D_{\alpha\beta}u \tilde{v}_2 \leq 0$. Une inégalité que se traduit par

$$B^{\alpha\beta}D_{\alpha\beta i}uD^i u + B^{\alpha\beta}D_{\alpha i}uD_{\beta}^i u \leq 0$$

ce qui, compte tenu de (5.4) et puisque le terme $B^{\alpha\beta}D_{\alpha i}uD_{\beta}^i u$ est positif, implique que $\tilde{v}_2(\xi_0) = 0$. Ainsi $\tilde{v}_2$ est partout nul et le lemme est prouvé.

A présent, pour tout $t \in [0, 1]$ et pour tout $w \in A^{1,\alpha}(\Sigma)$, on pose $T_t w = u_t$, où $u_t \in A^{2,\alpha}(\Sigma)$ est l'unique solution de

$$(5.5) \quad L[w]u_t = t \left[-w + (m-1)[1 + v_1(w)] - [1 + v_1(w)]^{\frac{3}{2}} e^w K(e^w \xi) \right].$$

Le lemme 3 montre que $u_t \in A^{2,\alpha}(\Sigma)$ et la théorie elliptique implique que

$$(5.6) \quad \|u_t\|_{C^{2,\alpha}(\Sigma)} \leq Cste.$$

La famille d'opérateurs T_t vérifie les propriétés suivantes :

- (i) Pour tout $w \in A^{1,\alpha}(\Sigma)$, $T_0 w = 0$.
- (ii) A t fixé, $w \mapsto T_t w$ est un opérateur compact de $A^{1,\alpha}(\Sigma)$ dans $A^{1,\alpha}(\Sigma)$. En effet, soit $\Gamma \subset A^{1,\alpha}(\Sigma)$ qu'on suppose borné dans $A^{1,\alpha}(\Sigma)$. Donc, d'après (5.6), $\{T_t w \mid w \in \Gamma\}$ est un sous ensemble de $A^{2,\alpha}(\Sigma)$ qui est uniformément borné dans $C^{2,\alpha}(\Sigma)$. L'ensemble $C^{2,\alpha}(\Sigma)$ étant un compact de $C^{1,\alpha}(\Sigma)$, on en déduit que $\{T_t w \mid w \in \Gamma\}$ est un sous ensemble de $A^{1,\alpha}(\Sigma)$ relativement compact.
- (iii) A w fixé, $t \mapsto T_t w$ est continue, sinon, il existerait une suite (t_i) dans l'intervalle $[0, 1]$ et un réel $\epsilon > 0$ tels que $\lim_{i \rightarrow \infty} t_i = t$ et, pour i assez grand,

$$(5.7) \quad \|\tilde{u}_{t_i} - \tilde{u}_t\|_{C^{1,\alpha}(\Sigma)} > \epsilon.$$

L'estimée (5.6) implique que la suite $(\tilde{u}_{t_i})$ est bornée dans $C^{2,\alpha}(\Sigma)$. L'injection de $C^{2,\alpha}(\Sigma)$ dans $C^{1,\alpha}(\Sigma)$ étant compacte, donc quitte à en extraire une sous-suite, on peut supposer que $(\tilde{u}_{t_i})$ converge dans $C^{1,\alpha}(\Sigma)$. D'après (5.5), et puisque $\tilde{u}_{t_i}$ est de classe $C^{2,\alpha}(\Sigma)$, sa limite est $\tilde{u}_t$. Il en découle que, pour i assez grand,

$$\|\tilde{u}_{t_i} - \tilde{u}_t\|_{C^{1,\alpha}(\Sigma)} < \epsilon/2.$$

Ceci contredit (5.7).

Compte tenu des propriétés (i), (ii) et (iii), l'opérateur T défini en posant

$$T(t, w) = w - T_t w \text{ pour } (t, w) \in [0, 1] \times A^{1,\alpha}(\Sigma)$$

est une déformation compacte de l'identité de $A^{1,\alpha}(\Sigma)$. Notre but est de résoudre l'équation

$$(5.8) \quad T(t, u) = 0, \text{ pour } t \in [0, 1],$$

dans $A^{1,\alpha}(\Sigma)$. Le lemme 2 et la théorie classique des équations elliptiques, cf. [6], implique qu'une telle solution u est dans $A^{2,\alpha}(\Sigma)$ et qu'il existe un réel $R > 0$ telle que

$$(5.9) \quad \|u\|_{C^{1,\alpha}(\Sigma)} < R.$$

On note alors

$$B_R = \{u \in A^{1,\alpha}(\Sigma) \mid \|u\|_{C^{1,\alpha}(\Sigma)} < R\}.$$

Compte tenu de (5.9), l'équation (5.8) n'admet pas de solution u sur le bord ∂B_R de B_R . La déformation T est donc une homotopie compacte sur le bord de B_R . En conséquence,

d'après [3], (théorème 5.3.14), le degré de Leray-Schauder de T en 0 relativement à B_R ne dépend pas de t . Ainsi, pour tout $t \in [0, 1]$, on a :

$$d(T(t, \cdot), 0, B_R) = d(T(0, \cdot), 0, B_R) = d(Id, 0, B_R) = 1.$$

En particulier, l'opérateur T_1 admet un point fixe $u \in A^{1,\alpha}(\Sigma)$, solution de classe $A^{2,\alpha}(\Sigma)$ de l'équation

$$\sum_{n+1 \leq \alpha, \beta \leq n+m-1} B^{\alpha\beta} D_{\alpha\beta} u = (m-1)(1+v_1) - (1+v_1)^{\frac{3}{2}} e^u K(e^u \xi).$$

Or $v_2(u)$ est partout nul, notre solution vérifie en fait l'équation

$$A^{ab} \tilde{D}_{ab} u = -v_2 + (m-1)(1+v) - (1+v)^{\frac{3}{2}} e^u K(e^u \xi).$$

Une équation qui est uniformément elliptique ce qui permet de conclure en ce qui concerne la régularité $\mathcal{C}^\infty(\Sigma)$ de toute solution de classe $\mathcal{C}^{2,\alpha}(\Sigma)$.

5.3 Preuve du théorème 3

La fonction $K \in \mathcal{C}^\infty(E_*)$ est donnée telle qu'il existe deux réels r_1 et r_2 tels que $0 < r_1 \leq 1 \leq r_2$ et

$$(5.10) \quad K(\xi) > \frac{m-1}{\|\xi\|} \text{ si } \|\xi\| < r_1, \quad K(\xi) < \frac{m-1}{\|\xi\|} \text{ si } \|\xi\| > r_2.$$

On cherche à résoudre dans Σ l'équation elliptique suivante :

$$(5.11) \quad A^{ab}(u) \tilde{D}_{ab} u = -v_2 + (m-1)(1+v) - (1+v)^{\frac{3}{2}} e^u K(e^u \xi).$$

Tout d'abord, on note $\Sigma' = \{\xi \in E \mid r_1 \leq \|\xi\| \leq r_2\}$, ν le champ radial unitaire et r la fonction $r(\xi) = \|\xi\|$. Soit $w \in \mathcal{C}^\infty(\Sigma')$, on désigne par w_1 la restriction de w à Σ que l'on prolonge en une fonction radialement constante et pour $u \in \mathcal{C}^\infty(\Sigma')$, on note $\tilde{D}^a u = e^{\mu_a w_1} D^a u$, $\tilde{D}^{ab} u = e^{(\mu_a + \mu_b) w_1} D^{ab} u$,

$$v_1(u) = (1 - \mu_a) \tilde{D}_a u \tilde{D}^a u, \quad v_2(u) = \mu_a \tilde{D}_a u \tilde{D}^a u, \quad \tilde{v}(u) = r^2 v_1(u) + v_2(u),$$

$$F(w) = -v_2(w_1) + (m-1) [1 + \tilde{v}(w_1)] - [1 + \tilde{v}(w_1)]^{3/2} e^{w_1} K\left(e^{w_1} \frac{\xi}{\|\xi\|}\right),$$

$$A^{ab}(w) = (1 + \tilde{v}(w_1)) G^{ab} - r^{2-\mu_a-\mu_b} \tilde{D}^a w_1 \tilde{D}^b w_1,$$

et $B(w) = (m-1) [1 + \tilde{v}(w_1)] - r^2 v_1(w_1)$. Si $t \in [0, 1]$ et $w \in \mathcal{C}^\infty(\Sigma')$, on désigne par $\tilde{u}_t$ l'unique solution du problème de Neumann

$$(5.12) \quad \begin{cases} D_{\nu\nu} u + A^{ab}(w) r^{2-\mu_a-\mu_b} \tilde{D}_{ab} u + \mu_a \log(r) \tilde{D}_a u - u = t \left[-w_1 + F(w) \right] \\ \quad + D_{\nu\nu} w + r B(w) D_\nu w - t \alpha \log(r) \sqrt{\tilde{v}(w_1)} \quad \text{dans } \Sigma' \\ D_\nu u = 0 \quad \text{sur } \partial \Sigma', \end{cases}$$

où

$$\alpha = 2 \sup_{\xi \in \Sigma} \sup_{\Sigma'} \left| r \frac{\partial [rK(r\xi)]}{\partial r} \right|.$$

La preuve de l'existence d'une solution $\tilde{u}_t \in C^{2,\alpha}(\Sigma')$ de (5.12) ainsi que de l'existence d'une constante positive C telle que

$$\|\tilde{u}_t\|_{C^{2,\alpha}(\Sigma')} \leq C$$

est très classique. On renvoie à [1] et [4], voir aussi [5], quant à l'unicité, elle découle du principe du maximum. L'équation (5.12) étant elliptique et toutes les données sont de classe $\mathcal{C}^\infty$, la solution $\tilde{u}_t$ est de classe $C^\infty(\Sigma')$ par régularité. En particulier, étant donnée une partie $\mathcal{B}$ bornée de $\mathcal{C}^\infty(\Sigma')$, il existe $\tilde{u}_t \in \mathcal{C}^\infty(\Sigma')$ ainsi qu'une suite de réels positifs $(C_k)_{k \geq 0}$ telle que, quel que soit $(t, w) \in [0, 1] \times \mathcal{B}$ et pour tout entier $k \geq 0$, on ait :

$$(5.13) \quad \|\tilde{u}_t\|_{\mathcal{C}^k(\Sigma')} \leq C_k.$$

Il en découle que l'opérateur T_t défini sur $\mathcal{C}^\infty(\Sigma')$ par $T_t w = \tilde{u}_t$ est compact. Il en est de même de l'opérateur T défini de $[0, 1] \times \mathcal{C}^\infty(\Sigma')$ vers $\mathcal{C}^\infty(\Sigma')$ par

$$(5.14) \quad T(t, w) = w - T_t w.$$

Notre objectif est de montrer que l'équation

$$(5.15) \quad T(t, u) = 0, \text{ pour } t \in [0, 1],$$

admet une solution dans $\mathcal{C}^\infty(\Sigma')$. Si une telle solution existe, celle-ci, notée $\tilde{u}_t$, est une constante radiale. En effet, $\tilde{u}_t$ vérifie le système suivant :

$$(5.16) \quad \begin{cases} A^{ab}(\tilde{u}_t) r^{2-\mu_a-\mu_b} \tilde{D}_{ab} \tilde{u}_t + \mu_a \log(r) \tilde{D}_a^a \tilde{u}_t - \tilde{u}_t = t \left[-u_t + F(\tilde{u}_t) \right] \\ + r B(\tilde{u}_t) D_\nu \tilde{u}_t - t \alpha \log(r) \sqrt{\tilde{v}(u_t)} \quad \text{dans } \Sigma' \\ D_\nu \tilde{u}_t = 0 \quad \text{sur } \partial \Sigma', \end{cases}$$

où l'on a noté par u_t le prolongement en une constante radiale de la restriction à Σ de $\tilde{u}_t$.

Dérivons radialement l'équation (5.16) et multiplions par r l'équation ainsi obtenue. Du fait que $D_\nu r = 1$ et puisque u_t est une constante radiale, il en découle que

$$(5.17) \quad \begin{aligned} & r D_\nu \left[A^{ab}(\tilde{u}_t) \right] r^{2-\mu_a-\mu_b} \tilde{D}_{ab} \tilde{u}_t + (2 - \mu_a - \mu_b) r^{2-\mu_a-\mu_b} A^{ab}(\tilde{u}_t) \tilde{D}_{ab} \tilde{u}_t \\ & + A^{ab}(\tilde{u}_t) r^{2-\mu_a-\mu_b} r \tilde{D}_{\nu ab} \tilde{u}_t + \mu_a \tilde{D}_a^a \tilde{u}_t + \mu_a \log(r) G^{ab} r \tilde{D}_{\nu ab} \tilde{u}_t - r D_\nu \tilde{u}_t \\ & = tr D_\nu F(\tilde{u}_t) + r B(\tilde{u}_t) D_\nu \tilde{u}_t + r D_\nu \tilde{u}_t r D_\nu \left[B(\tilde{u}_t) \right] + B(\tilde{u}_t) r^2 D_{\nu\nu} \tilde{u}_t \\ & \quad - t \alpha \sqrt{\tilde{v}(u_t)} - t \alpha \log(r) r D_\nu \sqrt{r^2 v_1(u_t) + v_2(u_t)}. \end{aligned}$$

Remarquons d'abord que par un calcul analogue à celui de la seconde section, on montre que

$$(5.18) \quad D_{e_a}(r\nu) = (1 - \mu_a)e_a,$$

où μ_a vaut 1 ou 0 selon que la direction e_a est horizontale ou verticale. Ainsi, usons de la définition de la dérivée covariante, on peut écrire :

$$D_{e_a}(rD_\nu u) = D^2u(e_a, r\nu) + Du\left(D_{e_a}(r\nu)\right) = rD_\nu(D_a u) + (1 - \mu_a)D_a u.$$

On en déduit que

$$rD_\nu(D_a u) = D_{e_a}(rD_\nu u) - (1 - \mu_a)D_a u$$

et, en particulier, pour une constante radiale u , on a :

$$(5.19) \quad rD_\nu v_1(u) = 2(1 - \mu_a)D_a(rD_\nu u)D^a u - 2v_1(u) = -2v_1(u),$$

$$rD_\nu v_2(u) = 2\mu_a \tilde{D}_a(rD_\nu u)\tilde{D}^a u + 2v_2(u)rD_\nu u = 0$$

Combinons cette relation avec le fait que u_t est une constante radiale, on obtient :

$$rD_\nu [r^2 v_1(u_t) + v_2(u_t)] = 0.$$

Ainsi, l'équation (5.17) se réduit à la suivante :

$$(5.20) \quad \begin{aligned} & (2 - \mu_a - \mu_b)r^{2-\mu_a-\mu_b}A^{ab}(\tilde{u}_t)\tilde{D}_{ab}\tilde{u}_t + A^{ab}(\tilde{u}_t)r^{2-\mu_a-\mu_b}r\tilde{D}_{\nu ab}\tilde{u}_t \\ & + \mu_a \tilde{D}_a^a \tilde{u}_t + \mu_a \log(r)G^{ab}r\tilde{D}_{\nu ab}\tilde{u}_t - rD_\nu \tilde{u}_t = rB(\tilde{u}_t)D_\nu \tilde{u}_t \\ & + B(\tilde{u}_t)r^2 D_{\nu\nu} \tilde{u}_t - t\alpha \sqrt{r^2 v_1(u_t) + v_2(u_t)}. \end{aligned}$$

D'autre part, la définition de la dérivée covariante nous permet d'écrire que

$$D_{ab}(rD_\nu u) = D^2(rD_\nu u)(e_a, e_b) = e_a \left[D(rD_\nu u)(e_b) \right] - D(rD_\nu u)(D_{e_a} e_b).$$

D'où

$$\begin{aligned} D_{ab}(rD_\nu u) &= e_a [D_{e_b}(Du(r\nu))] - (D_{e_a} e_b) Du(r\nu) \\ &= D_{e_a}(D^2u(e_b, r\nu) + D_{e_a} Du(D_{e_b}(r\nu))) \\ &\quad - D^2u(D_{e_a} e_b, r\nu) - Du(D_{D_{e_a} e_b}(r\nu)) \end{aligned}$$

et par suite

$$\begin{aligned} D_{ab}(rD_\nu u) &= D^3u(e_a, e_b, r\nu) + D^2u\left(e_b, D_{e_a}(r\nu)\right) + D^2u\left(e_a, D_{e_b}(r\nu)\right) \\ &\quad + Du\left(D_{e_a}(D_{e_b}(r\nu))\right) - Du\left(D_{D_{e_a} e_b}(r\nu)\right). \end{aligned}$$

Or, la relation (5.18) permet d'écrire que

$$Du(D_{e_a}(D_{e_b}(r\nu))) = (1 - \mu_b)Du(D_{e_a} e_b)$$

et

$$Du(D_{D_{e_a} e_b}(r\nu)) = (1 - \mu_b)Du(D_{e_a} e_b).$$

Ainsi, usons à nouveau de (5.18), on obtient :

$$D_{ab}(rD_\nu u) = D^3u(e_a, e_b, r\nu) + (2 - \mu_a - \mu_b)D^2u(e_a, e_b)$$

et d'après la définition de la connexion D et celle de la dérivée covariante, on voit que

$$(5.21) \quad D_{ab}(rD_\nu u) = rD_\nu(D_{ab}u) + (2 - \mu_a - \mu_b)D_{ab}u.$$

Eu égard à la relation (2.6) de la seconde section donnant l'expression de la courbure de D et dont découle l'égalité $D_{ab\nu}u = D_{\nu ab}u$. Reportons (5.21) dans (5.20), on obtient :

$$(5.22) \quad \begin{aligned} & A^{ab}(\tilde{u}_t)r^{2-\mu_a-\mu_b}\tilde{D}_{ab}(rD_\nu\tilde{u}_t) + \mu_a\tilde{D}_a^a\tilde{u}_t + \mu_a\log(r)\tilde{D}_a^a(rD_\nu\tilde{u}_t) \\ & - rD_\nu\tilde{u}_t = rB(\tilde{u}_t)D_\nu\tilde{u}_t + B(\tilde{u}_t)r^2D_{\nu\nu}\tilde{u}_t - t\alpha\sqrt{\tilde{v}(u_t)}. \end{aligned}$$

Rappelons que l'équation de Gauss et les calculs de la seconde section impliquent que pour deux fonctions $u_1, u_2 \in \mathcal{C}^2(\Sigma')$ ayant les mêmes valeurs sur Σ , on a :

$$(5.23) \quad D_{ab}u_1 = D_{ab}u_2 + (1 - \mu_a)G_{ab}D_\nu(u_1 - u_2), \quad a, b \leq n + m - 1.$$

Or $u_t = (\tilde{u}_t)|_\Sigma$. Donc, tenons compte de (5.23) et du fait que $D_\nu\tilde{u}_t$ est nul sur Σ , (5.22) implique la relation suivante :

$$(5.24) \quad \mu_a\tilde{D}_a^a u_t = -t\alpha\sqrt{v_1(u_t) + v_2(u_t)}, \quad \text{partout dans } \Sigma.$$

D'autre part, restreignons (5.16) à Σ , l'usage de (5.23) montre que la fonction u_t vérifie l'équation suivante :

$$(5.25) \quad A^{ab}(u_t)\tilde{D}_{ab}u_t - u_t = t \left[-u_t + F(u_t) \right], \quad \text{partout dans } \Sigma.$$

La fonction u_t étant une constante radiale, une combinaison des équations (5.24) et (5.25), montre que u_t est une autre solution de (5.16). En conséquence, on voit que

$$\left\{ \begin{array}{l} A^{ab}(\tilde{u}_t)r^{2-\mu_a-\mu_b}\tilde{D}_{ab}(\tilde{u}_t - u_t) + \mu_a\log(r)\tilde{D}_a^a(\tilde{u}_t - u_t) \\ - (\tilde{u}_t - u_t) = rB(\tilde{u}_t)D_\nu(\tilde{u}_t - u_t) \text{ dans } \Sigma' \\ D_\nu(\tilde{u}_t - u_t) = 0 \text{ sur } \partial\Sigma'. \end{array} \right.$$

Le principe du maximum montre que $\tilde{u}_t = u_t$ partout dans Σ' . Ceci montre que $\tilde{u}_t$ est une constante radiale.

A présent, on montre que u_t est estimée à priori $\mathcal{C}^0(\Sigma)$. Une majoration a priori se déduit immédiatement du principe du maximum. Soit $\xi \in \Sigma$ un point où u_t atteint son maximum. Si $u_t(\xi) > \log(r_2)$, l'hypothèse de croissance (5.10) faite sur K combinée avec l'équation (5.25) implique qu'au point ξ , on aura

$$0 \geq \tilde{D}_a^a u_t = (1 - t)u_t + t[(m - 1) - e^{u_t}K(e^{u_t}\xi)] > 0$$

ce qui constitue une contradiction, eu égard au fait que $\log(r_2) \geq 0$. La minoration $u_t \geq \log(r_1)$ s'obtient par analogie en considérant un point où u_t atteint son minimum.

La fonction u_t vérifiant les équations (5.24) et (5.25), d'après le lemme 1 elle est estimée a priori dans $\mathcal{C}^1(\Sigma)$. La théorie classique des équations uniformément elliptiques, voir à titre d'exemple [1], [4], [6], montre comment obtenir l'estimée $\mathcal{C}^{1,\alpha}$. Plus précisément,

on peut, par simple modification de la preuve du théorème 13.6 page 328 de Gilbarg et Trüdinger [4], conclure à l'existence d'un réel $c_1 > 0$ tel que

$$\|u_t\|_{\mathcal{C}^{1,\alpha}(\Sigma)} < c_1.$$

La fonction u_t étant une solution de l'équation (5.25), les inégalités de Schauder impliquent l'existence d'une constante positive C telle que

$$\|u_t\|_{\mathcal{C}^{2,\alpha}(\Sigma)} < C [\|u_t\|_{\mathcal{C}^0(\Sigma)} + \|F\|_{\mathcal{C}^{0,\alpha}(\Sigma')}]$$

et donc il existe une constante positive c_2 telle que

$$\|u_t\|_{\mathcal{C}^{2,\alpha}(\Sigma)} < c_2.$$

Supposons donc que pour tout $s \leq k$, pour un $k \geq 2$, on ait :

$$\|u_t\|_{\mathcal{C}^{s,\alpha}(\Sigma)} < c_s.$$

L'équation obtenue en dérivant $(k-1)$ fois l'équation (5.25) s'écrit localement sous la forme

$$A^{ab} \tilde{D}_{ab}(D_{i_1 i_2 \dots i_{k-1}} u_t) = H_{i_1 i_2 \dots i_{k-1}},$$

où le second membre $H_{i_1 i_2 \dots i_{k-1}}$ ne dépend que des dérivées covariantes de u_t d'ordre $\leq k$. Il est donc borné dans $\mathcal{C}^{0,\alpha}(\Sigma')$ et il en découle, d'après les inégalités de Schauder, que $\|D^{(k-1)} u_t\|_{\mathcal{C}^{2,\alpha}(\Sigma)} < c_{k+1}$, et par suite

$$\|u_t\|_{\mathcal{C}^{k+1,\alpha}(\Sigma)} < c_{k+1}.$$

On vient ainsi d'établir par récurrence l'existence de réels positifs a_k tels que

$$(5.26) \quad \|u_t\|_{\mathcal{C}^k(\Sigma')} < a_k.$$

Eu égard au fait que u_t est radialement constante. On note B la pseudo-boule définie par

$$B = \{u \in \mathcal{C}^\infty(\Sigma') \mid \|u\|_{\mathcal{C}^k(\Sigma')} < a_k\}.$$

Compte tenu de (5.26), l'équation (5.15) n'admet pas de solution sur le bord de B . La déformation T est donc une homotopie compacte sur le bord de B_R . En conséquence, d'après le théorème de Nagumo [7], le degré de T en 0 relativement à B ne dépend pas de t . Ainsi, pour tout $t \in [0, 1]$, on :

$$(5.27) \quad d(T(t, \cdot), 0, B) = d(T(0, \cdot), 0, B) = \gamma.$$

Or, pour $t = 0$, la fonction $u_0 = 0$ est l'unique solution de (5.15) et l'on montre aisément que pour $w \in \mathcal{C}^\infty(\Sigma')$, $(d_{u_0} T_0)(w) = u$, où u est l'unique solution du problème suivant :

$$(5.28) \quad \left\{ \begin{array}{l} D_{\nu\nu} u + r^{2-2\mu_a} D_a^a u + \mu_a \log(r) D_a^a u - u = D_{\nu\nu} w \\ \quad \quad \quad + (m-1)r D_\nu w \text{ dans } \Sigma' \\ D_\nu u = 0 \text{ sur } \partial\Sigma'. \end{array} \right.$$

A présent, si $w \in \ker[\text{id} - (d_{u_0}T_0)]$, celle-ci sera solution du problème suivant :

$$\begin{cases} r^{2-2\mu_a} D_a^a w + \mu_a \log(r) D_a^a w - w = (m-1)r D_\nu w & \text{dans } \Sigma' \\ D_\nu w = 0 & \text{sur } \partial\Sigma'. \end{cases}$$

Un raisonnement analogue à celui qui précède montre que w est une constante radiale. Celle-ci étant identiquement nulle sur Σ , donc partout nulle et par suite

$$(5.29) \quad \ker[\text{id} - (d_{u_0}T_0)] = \{0\}.$$

Or, d'après sa définition et en raisonnant comme auparavant, on vérifie que $d_{u_0}T_0$ est un opérateur compact de $\mathcal{C}^\infty(\Sigma')$ vers $B^{1,\beta}(\Sigma')$, $0 < \beta < \alpha$, et donc, tenons compte de (5.29), le théorème d'alternative de Fredholm implique que l'opérateur $\text{id} - (d_{u_0}T_0)$ est inversible. En conséquence 0 est un point régulier pour $\text{id} - T_0$. Ainsi, dans (5.27), $\gamma = \pm 1$ et en particulier, l'opérateur T_1 admet un point fixe de classe $\mathcal{C}^\infty(\Sigma')$. Celle-ci est une constante radiale qui est une solution de (5.11) dans Σ . Ceci achève la preuve du théorème.

5.4 Remarques

1- Expliquons ici en quel sens l'hypothèse de croissance des théorèmes 2 et 3 est la meilleure possible. Soit $K \in \mathcal{C}^\infty(E_*)$ une fonction strictement positive. On suppose qu'il existe un réel $a \in]0, 1[$ tel que

$$K(\xi) \leq \frac{a(m-1)}{\|\xi\|}, \quad \xi \in E_*.$$

Alors il n'existe pas de solution de classe $\mathcal{C}^2(\Sigma)$ de l'équation (5.11) ci-dessus. En effet, si une telle solution existe, on aura

$$(5.30) \quad A^{ab} \tilde{D}_{ab} u \geq -v_2 + (m-1)(1+v) - a(m-1)(1+v)^{\frac{3}{2}}.$$

En un point $\xi \in \Sigma$ où u atteint son maximum, on a : $v(\xi) = 0$ et dans un repère G -orthonormé diagonalisant $(D_{ab}u(\xi))$, (5.30) s'écrit au point ξ sous la forme

$$(5.31) \quad \sum_{1 \leq a \leq n+m-1} \tilde{D}_{aa} u \geq (m-1)(1-a).$$

Or $D_{aa}u(\xi) \leq 0$. Reportons dans (5.31), on voit que $1 \leq a$ ce qui est contradictoire.

On obtient la même conclusion s'il existe un réel $b > 1$ tel que

$$K(\xi) \geq \frac{b(m-1)}{\|\xi\|}, \quad \xi \in E_*.$$

2- Considérons une fonction K vérifiant les hypothèses du théorème 2 et supposons que pour tout $r \in [r_1, r_2]$, il existe $\xi \in \Sigma$ telle que

$$(5.32) \quad K(r\xi) \neq (m-1)r^{-1}.$$

D'après la preuve du théorème 2, il existe une solution $u_1 \in \mathcal{C}^\infty(\Sigma)$ de l'équation (5.11) ci-dessus à gradient horizontal identiquement nul, $v_2(u_1) = 0$, et telle que $r_1 \leq e^{u_1} \leq r_2$. D'autre part, la preuve du théorème 3 donne une solution u_2 de cette même équation telle que $r_1 \leq e^{u_2} \leq r_2$ et de sorte que pour un réel $\alpha > 0$, assez grand, on ait :

$$(5.33) \quad \mu_a e^{2u_2} D_a^a u_2 = -\alpha \sqrt{v(u_2)}.$$

Les deux graphes radiaux donnés par ces deux solutions ne sont pas homothétiques. Sinon, la fonction $u_1 - u_2 = Cste$, et donc $v_2(u_1) = v_2(u_2) = 0$. Reportons dans (5.33), et puisqu'alors $\mu_a e^{2u_2} D_a^a u_2$ est identiquement nul, il en découle que $v_1(u_2) = 0$, et par suite u_2 est une constante. Il existe alors $r \in [r_1, r_2]$ telle que $e^{u_2} = r$. L'équation (5.11) satisfaite par u_2 implique que $K(r\xi) = (m-1)r^{-1}$, quel que soit $\xi \in \Sigma$, contredisant ainsi (5.32).

Références

- [1] S. Agmon : Lectures on Elliptic boundary value problems ; Van Nostrand, Princeton, NJ 1965.
- [2] I. Bakelman and B. Kantor : Existence of spherically homeomorphic hypersurfaces in euclidean space with prescribed mean curvature ; Geometry and Topology, Leningrad, 1, 1974, 3-10.
- [3] M. S. Berger : Nonlinearity and functional analysis ; Academic Press, New York, San Francisco, London 1977, Pure and Applied Mathematics 74.
- [4] D. Gilbarg and N. Trüdinger : Elliptic partial differential equations of second order ; 2nd ed., Springer, New York, 1977.
- [5] O.A. Ladyzhenskaya and N.N. Ural'tseva : Linear and quasilinear elliptic equations ; Academic press, New York and London, 1968.
- [6] C. B. Morrey : Multiple integrals in the calculus of variations ; 130, Springer-verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1966.
- [7] M. Nagumo : Degree of mapping in convex linear topological spaces ; Amer. J. Math., 73, 1951, p. 497-511.
- [8] A. E. Treibergs and S. W. Wei : Embedded hypersurface with prescribed mean curvature ; J. Diff. Geo., 18, 1983, 513-521.
- [9] K. Yano and S. Ishihara : Tangent and cotangent bundles ; Marcel Dekker, New-York, 1973.
- [10] K. Yano and S. Ishihara : Horizontal lifts of tensor fields and connections to tangent bundles ; J. Math. and Mech., 16, 1967, 1015-1030.